



# LA PIPISTRELLE COMMUNE

*Pipistrellus pipistrellus*

## LE TAXON - L'ESPÈCE

Plus petite espèce de chiroptères (= chauve-souris) d'Europe : de la taille d'un pouce et de poids inférieur à une pièce de 50 centimes d'€

Vit presque partout en Europe. Elle est répandue en France métropolitaine jusqu'en Corse.

Famille des Vespertilionidés

## IDENTIFICATION

Pelage brun-roux sur le dos, brun-jaunâtre à gris-brun sur le ventre.

Base des poils foncée à brun-noir.

Oreilles, museau et patagium (membrane de peau fine et souple qui permet de voler) brun-noir.

Pattes et queue dépourvues de poil.

Oreilles courtes, triangulaires avec l'extrémité arrondie.

Ailes étroites et petites adaptées au vol papillonnant.

Cri : ultra-sons.

## ESPÈCES PROCHES

Pipistrelle pygmée (*Pipistrellus pygmaeus*) : elles se différencient uniquement par les ultra-sons.

Pipistrelle de Khul, pipistrelle de Natusius

<https://www.bretagne-vivante.org/Nos-actions/Connaitre/Les-mammiferes/Les-chauves-souris/Le-Groupe-Chiropteres/Les-chauves-souris-de-Bretagne>

## BIOLOGIE

### Cycle de vie

Habitat : villages et grandes villes. Parcs, jardins, bois, forêts. En plaine et en montagne (jusqu'à 2 000m).

S'abrite le jour dans les trous de pic, fissures, arbres creux, nichoirs, habitations..., en été change fréquemment de gîte

Insectivore qui chasse en vol la nuit en trois périodes principales. C'est la première chauve souris à aller chasser, peu après le coucher du soleil.

Cycle biologique :

- Hiver : hibernation de novembre à fin mars, généralement en groupes mixte mâle et femelles, dans les coins retirés d'habitations, grottes...
- Au sortie de l'hiver, séparation des sexes, en mai regroupement des femelles dans des gîtes estivaux pour la mise bas. les mâles restent solitaires
- Automne : parades, accouplement et constitution des réserves de graisse

## CÔTÉ REGAIN

### Rôle écologique

Elle consomme des nombreux petits insectes, jusqu'à 30000 moustiques par nuit, dont certaines espèces de papillons de nuits sont néfastes aux cultures et aux arbres fruitiers.

### Connectivité - dispersion - immigration

Animal sédentaire : Vit dans un espace de 20 à 30km entre gîte d'été et gîte d'hiver. Chasse jusqu'à 1 ou 2 km de son gîte : jardins et parcs zones humides, autour des éclairages urbains, zones boisées, milieux agricoles.

### Statut de protection

Comme tous les chiroptères la pipistrelle est une espèce protégée au niveau national. Elle est en préoccupation mineure sur la liste rouge France

## POUR EN SAVOIR PLUS

- <http://gmb.bzh/les-refuges-pour-les-chauves-souris/>
- <https://plan-actions-chiropteres.fr/les-chauve-souris/les-especes-en-france/pipistrelle-commune>
- Jardin sauvage « Des chauves-souris dans le jardin »
- [http://www1.onf.fr/activites\\_nature/sommaire/decouvrir/animaux/chauves\\_souris/vespertilionides/20071212-142339-608079/@@index.html](http://www1.onf.fr/activites_nature/sommaire/decouvrir/animaux/chauves_souris/vespertilionides/20071212-142339-608079/@@index.html)

Comment construire et installer un gîte à Chauve-souris chez soi

